

12/12

BULLETIN DE L'HERBIER BOISSIER

SOUS LA DIRECTION DE

EUGÈNE AUTRAN

Conservateur de l'Herbier.

Tome I.

1893

DAKDEN
BOTANICAL
NEW YORK
LIBRARY

(Chaque Collaborateur est responsable de ses travaux.)

Prix de l'Abonnement

12 FRANCS PAR AN POUR LA SUISSE. — 15 FRANCS PAR AN POUR L'ÉTRANGER.

Les Abonnements sont reçus
A L'HERBIER BOISSIER
CHAMBÉSY près Genève (Suisse).

GENÈVE
IMPRIMERIE ROMET. 26, BOULEVARD DE PLAINPALAIS
1893

LICHENES ARABICI

a cl. DR SCHWEINFURTH

IN ARABIA YEMENSI LECTI QUOS DETERMINAVIT

DR J. MÜLLER

1. **Roccella Montagnei** Bél. Voy. Ind. or., p. 47, t. XIII, fig. 4; ad ramulos. Schemisan supra Aden, alt. 1000-1775' (planta junior, hinc inde fertilis, tenuis, sed in formam latam abiens).
2. **Ramalina farinacea** Ach. Univ., p. 606: ramulicola, supra Aden ad Schemisan, 1000-1775' (ster.).
3. **Ramalina evernioides** Nyl. Prodr. L. Gall. et Alger., p. 47: ramulicola cum praecedente supra Aden (ster.).
4. **Theloschistes chrysophthalmus** v. **subinermis** Müll. Arg. L. B., n. 180; ad ramulos Acaciae menachensis, prope Menacha, 7000' (antea in Paraguay et in Australia orient. lecta).
5. **Xanthoria parietina** Th. M. Fries Scand., p. 145; ad trunco Acaciae menachensis prope Menacha, Yemen 7000' (planta omnino normalis).
6. **Parmelia caperata** Ach. Meth., p. 217; supra saxa, El-Ajan supra Menacha, 8000' (ster, cæterum omnino normalis).
7. **Amphiloma ochraceo-fulvum** Müll. Arg. L. B., n. 940; saxicola, El-Hausam in declivitate occident. montium Schibam ad 6000' (ster.). Huensque nonnisi in Somaliland lectum.
8. **Placodium fulgens** v. **bracteatum** Müll. Arg. Lich. Pers., n. 14: ad terram montium Schibam prope Menacha, ad 7000'.
9. **Placodium concrescens** Müll. Arg.: thallus ochroleucus, crassus, plagiolas 5-6 cm. latae formans, concrescenti-squamulosus: squamae totius plagiulae lateraliter incomplete connatae, non v. raro parce leviter imbricatae, planae, laeves, secus margines aut suturas albido-sorediosis v. lobulis ochroleucis irregulariter globosis demum confluentibus ornatae: apothecia ignota. — Affinis *Pl. gypsaceo* et *Pl. crasso* Müll. Arg., præsertim hujus varietati *cetrarioidi* (*Psoromati crasso* v. *cetrarioidi* Mass. Sched., n. 75), sed robustius, magis flavicans (ut *Parmelia cape-*

rata Ach.) et squame thalli quasi in thallum unicum monocentricum areolato-rimosum connatæ sunt. — Ad terram et supra muscos emortuos ad Menacha supra Aden, alt. 7000'.

10. **Thalloidima cæruleo-nigricans** (Lightf.) Pötsch Aufzählung, p. 212: ad terram El-Ejan montium Schibam prope Menacha supra Aden, 7000'.
11. **Diploschistes scruposus** v. **cretaceus** Müll. Arg. Lich. Pers., n. 42; *Urceolaria scruposa* v. *cretacea* Schaeff. Spicil., p. 76: ad saxa supra Menacha, 7000'.
12. **Opegrapha** (s. **Lecanactis**) **chloroconia** (Tuck.) Müll. Arg. in Bot. of Socotra, p. 374; ramulicola, sub cæspitibus *Roccellæ Montagnei* Bél. lecta, prope Schemisan supra Aden. — Hucusque in America septentrionali et in ins. Socotra observata fuit.
13. **Opegrapha** (s. **Lecanactis**) **vestita** Müll. Arg. Diagn. Lich. Socotr., p. 40; ramulicola, sub cæspitibus *Roccellæ Montagnei* Bél. lecta, ad Schemisan supra Aden (antea non nisi ex ins. Socotra nota).
14. **Dictyographa** Müll. Arg.; thallus crustaceus; gonidia chroolepoïdea: apothecia lirelliformi-gymnocarpica; peritheciū evolutū; paraphyses irregulares et elathratim connexæ; sporæ hyalinæ transversim divisiæ demum parenchymaticæ. — Est quasi *Opegrapha* sporis parenchymaticis. A *Graphina* recedit sporis primum *Opegrapha* et deinde paraphysibus intricatiū connexis. — Ad hoc novum genus etiam pertinet socotrensis *D. varians*, s. *Graphina varians* Müll. Arg. Diagn. L. Socotr., p. 12.
- Dictyographa arabica** Müll. Arg.: thallus albus, tenuissimus, margine effusus, laevis, mollis, subpulverulentus; lirellæ 1-1 1/2 mm. longæ, linearifusiformes, simplices et trifurcatæ, signoideæ aut varie curvatae, utrinque acuminatae, ex obtecto erumpentes, prominentes, strato thallino obtegente demum in vertice irregulariter secedente secus lineam tremulam denudatae, marginibus demum summo apice nudis et conniventibus subclausæ: peritheciū nigrum, basi incompletum; epitheciū olivaceo-nigricaus, lamina caeterum olivaceo-pallida, inferne strato obscurato imposita: asci 8-spori, cylindrico-obovoidei, apice haud pachydermei; spora 30-33 μ longæ, 5-7 μ lata, fusiformes, 8-10-locales, loculi ultimi utrinque extremitatis simplices, reliqui semel v. rarius bis longitrorum divisi. — Ab affini *D. varia* Müll. Arg. recedit lirellis obtectis, emergentibus (hand emersis), elongatis, demum non late aperto-hiantibus. — Corticola sub cæspitibus *Roccellæ Montagnei* Bél. in Schemisan supra Aden.
15. **Endocarpon pusillum** Hedw. Stirp. Crypt. II, p. 56, t. XX, fig. 8; *Dermatocarpon Schaefferi* Körb. Syst., p. 326; ad terram prope El-Ejan montium Schibam supra Menacha, 7000'.